

Migraine AINS et COVID-19 aucun risque

MIGRAINE

Publié le 25 janvier 2022

« Au début de la pandémie, la SFEMC avait déconseillé l'usage d'AINS pour traiter les crises de migraine par crainte d'une potentielle aggravation de l'infection à COVID-19 par ces traitements. De très larges études ont depuis montré que la prise d'AINS durant une infection par COVID-19 n'aggravait pas cette dernière. Alors que la pandémie se poursuit, les recommandations de la SFEMC pour le traitement de la crise de migraine sont donc d'utiliser un AINS et/ou un triptan chez tous les patients éligibles. »

Référence:

Drake TM et al. NSAID use and outcomes of covid-19 in the ISARIC clinical characterisation protocol UK cohort : a mtched prospective cohort study. Lancet Rheumatol 2021;3: e498-506.

Park J, Lee SH, You SC, Kim J, Yang K. NSAID agent use may not be associated with mortality of coronavirus disease 19. Scientific reports 2021;11: 5087.

Wong AYS et al. Use of NSAID and risk of death from COVID 19: an open safety cohort analysis based on 2 cohorts. Ann Rheum Dis 2021;80: 943-951.

Moore N, Bosco Levy P, Thurin N, Blin P, PerroteauC. NSAID and covid 19: a systematic review and metaanalysis. Drug Saf 2021 sept 44 (9): 929-938.

Lund LC et al. Adverse outcomes and mortality in users of NSAID who tested positive for SARS-Cov-2: A Danish nationwide cohort study. Plos Medicine sept2020: 1-16